SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH HƯNG YÊN
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 53 /TB-BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 01 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
(Từ ngày 26/10/2023 - 01/11/2023)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Nhiệt độ: 24 - 32^{0}C

Độ ẩm: Trung bình: 74 - 87%

Thời tiết tuần qua trời trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 24 - 32^{0}C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho trồng, chăm sóc cây vụ Đông và cây trồng phát triển.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

- Rau màu

+ Rau màu vụ Đông: Đến nay toàn tỉnh gieo trồng được 4.913 ha

+ Giai đoạn sinh trưởng: Mới trồng - phát triển sinh khối - thu hoạch.

- Cây ăn quả: Cây có múi: quả chín - thu hoạch; Quất cảnh: phát triển quả.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 07 NGÀY QUA

1. Trên cây rau màu vụ Đông

- Bệnh lở cổ rễ tiếp tục xuất hiện và gây hại nhẹ, cục bộ trên rau màu, chủ yếu ở một số ruộng trũng, ruộng thoát nước kém.

- Sâu xanh, sâu khoang gây hại rải rác trên các loại rau ăn lá, mật độ phổ biến 1-3 con/m^2, nơi cao 5-7 con/m^2; sâu đục quả đậu đỗ gây hại nhẹ, rải rác.

- Bệnh sương mai, thán thư phát sinh và gây hại nhẹ, rải rác trên bí, dưa chuột, tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số lá, nơi cao 7 -10% số lá (cấp bệnh 1). Ngoài ra bọ trĩ, bọ phấn, rệp muội gây hại nhẹ, rải rác.

- Trên cây Ngô: Sâu keo mùa thu xuất hiện gây hại cục bộ, mật độ nơi cao 2 - 3 con/m^2. Nông dân tiếp tục phòng trừ những nơi có mật độ sâu cao đạt kết quả tốt. Ngoài ra sâu khoang, sâu xám gây hại nhẹ, rải rác.

- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị…): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

2. Trên cây ăn quả

- Cây có múi: Bệnh vàng lá thối rễ, bệnh vàng lá gân xanh tiếp tục gây hại nhẹ, cục bộ; Nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng xuất hiện và gây hại nhẹ, rải rác.

- Ruồi đục quả gây hại nhẹ trên một số cây ăn quả bước vào giai đoạn quả chín sinh lý (bưởi, ổi…), nhất là ở các vườn trồng dầy, ít áp dụng các biện pháp phòng trừ.

Nhìn chung, nông dân đã và đang áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại đạt kết quả tốt.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên cây rau màu

- Trên bí, dưa chuột: Bệnh sương mai, phấn trắng gây hại nhẹ rải rác. Ngoài ra, ruồi đục lá, rệp muội, bọ trĩ gây hại nhẹ, cục bộ.

- Trên Khoai tây: Bệnh héo xanh xuất hiện và gây hại rải rác.

- Trên Ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại cục bộ, chủ yếu ở những khu vực trồng trồng xen kẹp với cây trồng khác.

- Trên cây rau màu khác: Bệnh lở cổ rễ tiếp tục xuất hiện và gây hại giai đoạn mới trồng đến khi phát triển sinh khối, chủ yếu ở những ruộng thoát nước kém. Ngoài ra, sâu khoang, sâu xanh gây hại gia tăng trên các loại rau ăn lá, bọ nhảy gây hại cục bộ ở một số ruộng trồng chuyên canh rau.

- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị…): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

2. Trên cây ăn quả

- Trên cây có múi: Bệnh vàng lá - thối rễ tiếp tục xuất hiện cục bộ ở một số vườn trồng trên đất chua, ít sử dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ vi sinh, vườn thoát nước kém trong mùa mưa và bị tuyến trùng hại rễ. Ngoài ra Bệnh khô cuống quả, bệnh greenning, nhện trắng, nhện rám vàng, bọ trĩ, rệp sáp gây hại nhẹ rải rác.

- Ruồi đục quả tiếp tục gây hại gia tăng trên một số cây ăn quả (cây có múi, ổi và rau quả như mướp, bí…), nhất là ở các vườn trồng dầy, ít áp dụng các biện pháp phòng trừ.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG

1. Trên cây rau màu

- Tiếp tục tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiếp tục chủ động trồng cây vụ Đông theo đúng lịch thời vụ với từng loại cây trồng.

- Theo dõi chặt chẽ sâu bệnh trên rau màu; khuyến cáo nông dân tăng cường sử dụng phân hữu cơ ủ mục với vôi bột hoặc các chế phẩm sinh học để bón nhằm cung cấp dinh dưỡng để rau màu phát triển tốt, đồng thời góp phần cải tạo đất, làm giảm nguồn dịch hại tồn tại trong đất.

- Khuyến cáo nông dân ưu tiên sử dụng thuốc BVTV sinh học, chế phẩm Nano bạc, Nano đồng để phòng trừ sâu bệnh trên rau màu (nhất là ở thời điểm trước thu hoạch) nhằm đảm bảo an toàn VSTP.

- Trên ngô: Hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu keo mùa thu trên ngô vụ Đông bằng các biện pháp như: Sử dụng bẫy, bả chua ngọt để diệt trưởng thành, ngắt bỏ ổ trứng, những nơi có mật độ sâu cao phun trừ bằng những loại thuốc như: Dylan 2EC, Comda Gold 5WG, Radiant 60SC, Match 50EC....tập trung phun trừ sớm khi sâu tuổi nhỏ (tuổi 1-3).

- Đối với nhóm rau gia vị: Sâu bệnh gây hại không đáng kể nên không cần áp dụng biện pháp hóa học để phòng trừ.

2. Trên cây ăn quả

- Cây có múi:

Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh chính; Hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời theo nguyên tắc “4 đúng”. Ngoài ra, cần thường xuyên vệ sinh đồng

ruộng, nhổ bỏ những cây xuất hiện triệu chứng bệnh greening để tránh nguồn bệnh lây lan trên đồng ruộng.

- Đối với Ruồi đục quả gây hại các loại cây ăn quả:

Thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng trừ Ruồi đục quả trên các vườn cam, quýt, bưởi và nhóm cây ăn quả khác (nhất là ở thời kỳ quả bước vào giai đoạn chín sinh lý đến khi thu hoạch) bằng các biện pháp như: Bao quả, sử dụng bẫy Feromol, bẫy xua đuổi hoặc phun một số chế phẩm chiết xuất từ thảo mộc có tính xua đuổi ruồi vàng như Support Ruồi vàng, Chivi.

Vệ sinh đồng ruộng, thu gom những quả bị rụng, bộ phận cây mang tàn dư sâu, bệnh để tiêu hủy nhằm giảm nguồn sâu, bệnh phát tán lây lan trên đồng ruộng.

Lưu ý: Tuyệt đối không lạm dụng thuốc BVTV trên các loại cây trồng, chỉ sử dụng thuốc khi cần thiết;Hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh phải theo nguyên tắc "4 đúng"và tuân thủ thời gian cách ly sau phun thuốc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm./.

Nơi nhận:
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Sở Nông Nghiệp và PTNT;
- TTBVTV phía Bắc;
- UBND các huyện, thị xã, tp;
- Đài PT và TH tỉnh, Báo HY;
- Trạm BVTV các huyện, tx, tp;
- Lưu: VT, Phòng KT.

thay báo cáo

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HƯNG YÊN
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Ký bởi: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 01/11/2023 15:15:26

Lê Minh Nam