SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH HƯNG YÊN
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Số: 08 /TB-BVTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 16 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 01 THÁNG QUA
(Từ ngày 15/01/2024 - 15/02/2024)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết:

Nhiệt độ: 8-28^{0}C.

Độ ẩm: Trung bình: 60 - 95 %

Tháng qua thời tiết trời nhiều mây, có xen kẽ một số ngày mưa nhỏ, mưa phùn, từ giữa đến cuối tháng 01 có rét đậm, rét hại; đầu đến giữa tháng 02 trời ấm dần. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho gieo cấy vụ Xuân và cây trồng sinh trưởng phát triển,…

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

- Mạ vụ Xuân: 1.650 ha; Lúa mới gieo cấy: 2.257 ha

- Rau màu: Diện tích thu hoạch cây vụ Đông 6.897ha. Trồng rau màu vụ Xuân: 330 ha; Giai đoạn sinh trưởng: Mới trồng - Phát triển sinh khối.

- Cây ăn quả:

+ Cây vải, nhãn: Phân hóa mầm hoa - ra hoa.

+ Cây có múi: ra lộc Xuân, phân hóa hoa - ra hoa.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI THÁNG QUA

1. Trên mạ, lúa mới gieo cấy

- Chuột hại nhẹ, cục bộ trên mạ và lúa mới gieo cấy ở khu vực ven làng, gần gò đống, kênh mương (nơi chưa triển khai diệt chuột). Các địa phương đã và đang triển khai tốt chiến dịch diệt chuột diện rộng đợt 1, đến ngày 14/02/2023 đã có 99/159 xã, phường, thị trấn đặt bả diệt chuột và đạt kết quả tốt.

- Ốc bươu vàng xuất hiện và gây hại cục bộ chủ ở một số chân ruộng gần kênh tưới tiêu; mật độ ốc nơi cao 0,3-0,5 con/m^2.

2. Trên cây rau màu

- Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ gây hại nhẹ; mật độ phổ biến 1-3 con/m^2, cục bộ 5-7 con/m^2; Ngoài ra, rệp muội, bọ nhảy, bệnh sương mai, thối nhũn gây hại nhẹ, cục bộ những ruộng chuyên trồng rau.

- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị…): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

3. Trên cây ăn quả

- Cây có múi: Sâu vẽ bùa, rệp muội, bọ trĩ, nhện đỏ gây hại nhẹ, rải rác ở những vườn cây đang ra lộc Xuân, ra hoa.

- Cây nhãn, vải:

+ Bệnh sương mai xuất hiện và gây hại rải rác trên diện nhãn ra hoa sớm; tỷ lệ hại nơi cao 1-3% chùm hoa (cấp 1).

+ Sâu đục giò hoa, sâu đo xuất hiện và gây hại nhẹ, rải rác; mật độ nơi cao 1-3% chùm hoa; rệp sáp, rệp muội gây hại cục bộ ở một số vườn trồng dày, ít quan tâm cắt tỉa. Ngoài ra, rầy chổng cánh vân nâu gây hại rải rác trên một số vườn nhãn đang ra lộc.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên mạ, lúa mới gieo cấy

- Chuột tiếp tục gây hại nhẹ, cục bộ ở khu vực diệt chuột còn sót lại hoặc nơi diệt chuột kém hiệu quả, chủ yếu ở khu vực gần làng, gần khu công nghiệp, gần gò đống, kênh mương.

- Ốc bươu vàng tiếp tục xuất hiện và gây hại chủ yếu ở những khu vực ruộng trũng, ruộng gần kênh tưới tiêu.

- Cỏ dại gây hại trên một số chân ruộng vàn cao, khô nước nếu không được phòng trừ tốt nhất là trên diện lúa gieo thẳng.

- Bệnh nghẹt rễ xuất hiện và gây hại cục bộ trên một số ruộng lúa cấy gặp rét, bị cạn nước hoặc bị ngộ độc hữu cơ.

2. Trên cây rau màu

- Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu khoang tiếp tục gây hại nhẹ, rải rác trên các loại rau ăn lá; Rệp, bọ nhảy, bệnh sương mai gây hại cục bộ những ruộng chuyên trồng rau họ hoa thập tự.

- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị…): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

3. Trên cây ăn quả

- Cây có múi: Sâu vẽ bùa, rệp muội, nhện đỏ, bọ trĩ tiếp tục phát sinh và gây hại trên diện cây có múi ở thời kỳ ra lộc Xuân, ra hoa, nhất là trong điều kiện thời tiết ấm.

- Cây vải, nhãn:

+ Bệnh sương mai, thán thư, rệp, bọ trĩ, sâu đo phát sinh và gây hại gia tăng ở thời kỳ cây ra hoa - đậu quả non, nhất là khi thời tiết ấm và độ ẩm không khí cao, nhiều ngày mưa phùn; bọ xít nâu phát dục và đẻ trứng khi thời tiết ấm dần.

+ Rệp sáp, rệp muội, bọ trĩ gây hại cục bộ ở một số vườn trồng dày, ít áp dụng biện pháp cắt tỉa; Sâu đo, sâu đục giò hoa, rầy chổng cánh vân nâu tiếp tục phát sinh và gây hại nhẹ, rải rác.

Nếu không thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, sâu bệnh trên cây ăn quả (nhãn vải, cây có múi, ổi...), nhất là ở thời kỳ ra hoa - đậu quả, đồng thời không có biện pháp xử lý phù hợp và kịp thời sẽ ảnh hưởng đến quá trình đậu quả và năng suất.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG

1. Trên lúa

Thực hiện tốt Kế hoạch số 01/KH-SNN-BVTV ngày 02/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên về Kế hoạch thực hiện chiến dịch diệt chuột diện rộng vụ Xuân 2024 đảm bảo tiến độ và đạt kết quả tốt nhất.

- Theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện của Ốc bươu vàng trên đồng ruộng trước và sau gieo cấy, nơi xuất hiện ốc bươu vàng với mật độ cao phòng trừ bằng mọi biện pháp như bắt thủ công hoặc dùng thuốc trừ ốc như Amani 70WP, Clodansuper 700 WP, Chopper 700 WP...

Chú ý: Thuốc trừ ốc bươu vàng rất độc với tôm, cua, cá nên không được rút nước xuống ao, hồ sau khi dùng thuốc.

- Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc trừ cỏ trên lúa an toàn, hiệu quả bằng các thuốc có chứa hoạt chất an toàn như: Thuốc trừ cỏ tiền này mầm (Sofit 300 EC; Prefit 300EC), thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm (Acenidax 17WP, sunrice 15WDG, Quinix 32WP) theo liều lượng, thời gian khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất.

Chú ý: Không sử dụng thuốc trừ cỏ trong điều kiện thời tiết rét, nhiệt độ dưới 15^0C.

- Những ruộng bị nghẹt rễ cần áp dụng biện pháp như phun thuốc kích rễ (khi thời tiết ấm), bón vôi bột cho những ruộng lúa bị ngộ độc hữu cơ... để cây lúa nhanh phục hồi và phát triển tốt.

2. Trên cây rau màu

- Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy xuất hiện mật độ cao trên rau họ thập tự, sâu đục quả, rệp, bọ trĩ hại đậu đỗ, dưa chuột cần phòng trừ bằng thuốc sinh học như: Aizabin WP, Vi - BT, Bitadin WP, VK.

- Đối với nhóm rau gia vị: Sâu bệnh gây hại không đáng kể nên không cần áp dụng biện pháp hóa học để phòng trừ.

3. Trên cây ăn quả

- Cây nhãn, vải:

+ Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và sự phát sinh của các đối tượng sâu, bệnh hại nhãn, vải để hướng dẫn nông dân áp dụng các biệp pháp kỹ thuật phù hợp để thúc đẩy quá trình ra hoa, đậu quả, đồng thời chủ động phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh gây hại đạt hiệu quả cao.

+ Bệnh sương mai, thán thư phát sinh, phát triển trong điều kiện thời tiết ấm, độ ẩm không khí cao và ít nắng nhất thiết phải phòng trừ sớm bằng thuốc đặc hiệu như Sago Perfect 320SC, Amistar 250SC, Phytocide 50WP, Dosay 45WP, Ridomil Gold 68 WG.... Nếu trong thời kỳ ra hoa - đậu quả non mà xuất hiện nhiều ngày âm u, mưa phùn, độ ẩm không khí cao cần phun phòng lại lần 2 vào thời điểm trước khi hoa nở hoặc sau khi đậu quả non.

+ Rệp sáp, rệp muội, bọ trĩ, sâu đo... xuất hiện với mật độ cao cần phòng trừ bằng các thuốc như Movento 150OD, Kola 700 WG, Radiant 60SC, Brightin 4.0 EC; Bọ xít nâu phát sinh cần phòng trừ bằng thuốc đặc hiệu, đồng thời theo dõi chặt chẽ sâu đục cuống quả để tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả.

- Cây có múi:

Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh chính; Hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, bọ trĩ, rệp muội nơi có mật độ cao (chủ yếu ở thời kỳ cây ra lộc non, cây ra hoa – đậu quả non) bằng các thuốc đặc hiệu như: Radiant 60SC, Kola 700 WG, Brightin 4.0 EC...; nhện đỏ phòng trừ bằng các thuốc đặc hiệu như: Detect 50WP, Catex 3.6EC, KingSpider 93SC, Comite 73EC, Alterkil 45SC… theo nguyên tắc "4 đúng".

Lưu ý: + Tuyệt đối không lạm dụng thuốc BVTV trên các loại cây trồng, chỉ sử dụng thuốc khi cần thiết;Các vùng trồng cây ăn quả đã được cấp Mã số vùng trồng cần tuân thủ chặt chẽ theo quy định để đảm bảo được duy trì.

+ Hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh phải theo nguyên tắc "4 đúng" tuân thủ thời gian cách ly sau phun thuốc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh Uỷ, UBND Tỉnh; (thay)
- Cục Bảo vệ thực vật; (báo)
- Sở Nông Nghiệp và PTNT; (cáo)
- TTBVTV phía Bắc;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài, Báo Hưng Yên;
- Trạm BVTV các huyện, thị xã, tp;
- Lưu: VT, Phòng KT.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Cơ quan: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 16/02/2024 10:40:58

Lê Minh Nam