SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH HƯNG YÊN
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28 /TB-BVTV

Hưng Yên, ngày 05 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO
TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
(Từ ngày 30/5/2024 - 05/6/2024)

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Nhiệt độ: 26 - 36^{0}C

Độ ẩm: Trung bình: 70 - 90%

Thời tiết tuần qua mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, có xen kẽ mưa rào và dông; nền nhiệt độ dao động từ 26 - 36^{0}C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển; tuy nhiên mưa rào và dông làm một số diện tích lúa bị đổ.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng:

- Trên lúa: GĐST: Chín - thu hoạch.
- Cây rau màu vụ Xuân: Diện tích 6.867,6ha (thu hoạch: 3.847ha); Trồng rau màu vụ Hè - Thu 445 ha.
- Cây nhãn, vải và cây có múi: Nhãn, cây có múi phát triển quả, vải chín, thu hoạch.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 07 NGÀY QUA

1. Trên cây lúa

Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại cục bộ trên diện lúa trỗ muộn, chủ yếu những ruộng gần nơi đã thu hoạch rầy di chuyển sang; mật độ rầy nơi cao 1.000-1.500 con/m^2, cục bộ trên 3.000con/m^2.

Các đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại cơ bản đã được phòng trừ kịp thời, đạt hiệu quả tốt.

2. Trên cây rau màu

- Cây rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ tiếp tục gây hại nhẹ, rải rác; mật độ nơi cao 2-3 con/m^2, cục bộ 7 con/m^2; bọ nhảy gây hại cục bộ ở một số vùng chuyên canh rau họ thập tự. Ngoài ra, bệnh sương mai, thối nhũn, đốm vòng cải bắp gây hại nhẹ, rải rác.
- Cây dưa chuột, bí xanh: Bệnh sương mai, phấn trắng gây hại nhẹ, rải rác; tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số lá (cấp bệnh 1-3); Bọ trĩ, rệp muội gây hại cục bộ, phạm vi hẹp.
- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị…): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

3. Trên cây ăn quả

- Cây có múi: Các đối tượng: nhện nhỏ (nhện trắng, nhện rám vàng), rệp, bọ trĩ, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh vàng lá gân xanh, loét vi khuẩn gây hại nhẹ, rải rác.
- Cây nhãn: Sâu đục cuống quả, bọ xít nâu gây hại nhẹ, rải rác ở một số vườn không phòng trừ tốt. Ngoài ra: rệp sáp ống, bọ trĩ, bọ phấn phát sinh và gây hại nhẹ cục bộ. Nhìn chung, nông dân đã phòng trừ tốt nơi xuất hiện mật độ sâu cao.

III. DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Trên cây rau màu

- Cây rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ tiếp tục xuất hiện và gây hại nhẹ, rải rác; bọ nhảy gây hại cục bộ ở một số vùng chuyên canh rau họ thập tự.

- Cây dưa chuột, bí xanh: Bệnh sương mai, phấn trắng tiếp tục gây hại nhẹ, rải rác; Bọ trĩ, rệp muội gây hại cục bộ, phạm vi hẹp.

- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị…): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.

2. Trên cây ăn quả

- Trên cây có múi: Các đối tượng như: nhỏ (nhện trắng, nhện rám vàng), sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh vàng lá gân xanh, loét vi khuẩn tiếp tục gây hại nhẹ, cục bộ.

- Cây nhãn: Bọ xít nâu tiếp tục gây hại cục bộ ở những vườn ít quan tâm áp dụng biện pháp cắt tỉa, phòng trừ không tốt. Ngoài ra, Rệp sáp, bọ phấn, bọ trĩ gây hại cục bộ ở một số vườn trồng dày.

- Trên cây ổi: Bọ xít muỗi xuất hiện và gây hại cục bộ; sâu róm, sâu đục búp gây hại nhẹ, rải rác.

IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ĐỊA PHƯƠNG

1. Trên cây lúa

+ Khẩn trương thu hoạch diện tích lúa chín, đồng thời chuẩn bị tốt cho công tác sản xuất vụ Mùa.

+ Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và các đối tượng sâu bệnh chính trên các loại cây trồng để chủ động thông báo, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiệt hại do thời tiết và sâu bệnh gây ra đến mức thấp nhất.

2. Trên cây rau màu

- Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy xuất hiện mật độ cao trên rau họ thập tự, sâu đục quả, rệp, bọ trĩ hại đậu đỗ, dưa chuột cần phòng trừ bằng thuốc sinh học như: Aizabin WP, Vi–BT, Bitadin WP, VK. Những vùng trồng chuyên canh rau họ thập tự mà thường xuyên xuất hiện Bọ nhảy mật độ cao cần áp dụng các biện pháp luân canh với nhóm rau khác.

- Đối với nhóm rau gia vị: Sâu bệnh gây hại không đáng kể nên không cần áp dụng biện pháp hóa học để phòng trừ.

3. Trên cây ăn quả

- Cây nhãn: Tiếp tục theo chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh chính như Bệnh sương mai, thán thư; Rệp sáp, bọ phấn, bọ trĩ, bọ xít để khuyến cáo kịp thời nông dân phòng trừ nơi sâu, bệnh có nguy cơ bùng phát bằng các thuốc đặc hiệu.

- Cây có múi:

Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh chính; Hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu vẽ bùa, rầy chổng cánh, bọ trĩ, rệp muội nơi có mật độ cao bằng các thuốc đặc hiệu như: Radiant 60SC, Kola 700 WG, Brightin 4.0 EC...; nhóm nhện nhỏ (nhện đỏ, nhện trắng, nhện rám vàng) phòng trừ bằng các thuốc đặc hiệu như: Detect 50WP, Catex 3.6EC, KingSpider 93SC, Alterkil 45SC… theo nguyên tắc “4 đúng”.

Lưu ý: + Tuyệt đối không lạm dụng thuốc BVTV trên các loại cây trồng, chỉ sử dụng thuốc khi cần thiết, khi áp lực sâu, bệnh cao; Các vùng trồng cây ăn quả đã được cấp Mã số vùng trồng cần tuân thủ chặt chẽ theo quy định để đảm bảo được duy trì.

+ Hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh phải theo nguyên tắc "4 đúng" tuân thủ thời gian cách ly sau phun thuốc để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm./.

Nơi nhận:
- Cục Bảo vệ thực vật;
- Sở Nông Nghiệp và PTNT;
- TTBVTV phía Bắc;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh và TH tỉnh, Báo Hưng Yên;
- Trạm BVTV các huyện, thị xã, tp;
- Lưu: VT, Phòng KT.

thay báo cáo

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Ký bởi: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 05/06/2024 17:16:15

Lê Minh Nam